



髋關節骨折復原過程:手術前到第7天

Hip Fracture Recovery Pathway: Before Surgery to Day 7

	HIP Fracture Recovery Pathway: Before Surgery to Day 7						
照護 (Care)	手術前 (Before Surgery)	手術日 (Day of Surgery)	第 1 天 (Day 1)	第 2 天 (Day 2)	第3天 (Day 3)	第 4-7 天 (Day 4-7)	出院目標 (Discharge Goals)
流體及 營養 (Fluid and Nutrition)	→ 不可飲食 → 若手術延遲則可進食 → 進行靜脈注射 (IV) 以提供流體及藥物 → 可置入膀胱導管	→ 手術後可正常 飲食 → 腸道護理	→ 慢慢恢復正常飲食 → 視需要進行靜脈注射 → 坐在椅子上進食	→ 飲食中開始增加蛋白 質和卡路里 → 視需要進行靜脈注射 → 視需要進行腸道例行 運動			5
活動 (Activity)	→ 臥床休息 → 需要他人攙扶 → 視需要提供口部及 皮膚照護 → 每小時進行深呼吸 練習 (每小時 10 次)	→ 視需要請他人 攙扶行動 → 深呼吸練習	→ 深呼吸練習 → 由他人協助下床 → 開始進行物理治療, 以恢復體力和走路 能力	→ 深呼吸練習 → 物理治療 → 可清潔身體 → 檢查轉移、安全 移動、設備及 鞋款等事項	→ 深呼吸練習 → 走路和運動 → 可更衣和自行 清潔身體 → 視需要進行職 能治療	→ 深呼吸練習 → 増加走路和 獨立自理 能力	Å _
治療 (Treatment)	→ 視需要尋求專業 人士協助 → 血液檢查、X 光掃 描、 心電圖	→ 手術	→ 血液檢查 → 視需要由專科醫師 進行後續追蹤 → 視需要冰敷開刀切口	→ 可更換/拿掉敷裹 物料 → 可拿出導管	→ 拔除靜脈注 射針		→ 檢查後續追蹤和門診安排 → 複習如何照護開刀切口
藥物 (Medication)	→ 靜脈注射 → 止痛藥 → 開始施打抗生素	→ 靜脈注射 → 止痛藥 → 抗生素 → 薄血劑 → 開始服用非處 方藥	→ 靜脈注射和非處方藥 → 薄血劑 → 抗生素 → 視需要服用止痛藥 → 補充鈣質和 維他命 D	→ 非處方藥 → 視需要服用止 痛藥 → 薄血劑 → 補充鈣質和 维他命 D		→ 視需要服用 骨質疏鬆症 藥物和接受 指導	→ 檢査藥物
出院計畫 (Discharge Plan)	→ 討論您的出院需求 (例如,設備及 資源) → 討論個人指示 → 討論調養身體地點 的最佳選擇(例如, 住家、當地醫院、 療養院)	→ 手術後更新 家人/連絡 人資訊	→ 檢查預防措施 → 瞭解薄血劑 → 瞭解如何: • 安全行動 • 防止跌跤 → 檢查出院目標及各種 選項	→ 和您的醫療團隊一起 審查評估出院計畫, 包含所需要的場所 或服務	→ 檢査: ・ 出院計畫及 目標 ・ 設備 ・ 所需服務	→ 前往計畫 安排的地點 調養身體	→ 視需要提供居家照護支援 及監控服務 → 您需瞭解自己的出院指示 → 您需知道 • 必須遵循的預防措施 • 如何做運動 • 需要哪些設備 ◆ 感染的跡象 • 何時要連絡家庭醫生 或外科醫師